

Opioid Overdose Response Instructions for Naloxone HCl Nasal Spray

1 CHECK IF YOU SUSPECT AN OVERDOSE



- CHECK** for signs of an opioid overdose:
- Will not wake up or respond to your voice or touch or very sleepy.
 - Breathing is slow or irregular (snoring, gurgling, or gasping).
 - Not breathing.
 - Faint pulse.
 - Pale or clammy skin, blue or grayish lips/ fingertips.
 - Center part of eye is very small, sometimes called “pinpoint pupils.”

2 GIVE NALOXONE NASAL SPRAY




- **LAY** the person on their back.
- **HOLD** the Nasal Spray with your thumb on the bottom of the plunger and your first and middle fingers on either side of the nozzle.
- **TILT** the person’s head back and insert the tip of the nozzle into either nostril.
- **PRESS** the plunger firmly to give the 1st dose of the Nasal Spray.
- **PLACE** the person on their side.

3 CALL FOR EMERGENCY MEDICAL HELP



- **CALL 911** immediately after giving the 1st dose.
- Even persons who respond to Naloxone should be assessed and treated by trained medical personnel.

4 WATCH & GIVE



- **WAIT** 2-3 minutes after the 1st dose to give the medicine time to work.
- If the person wakes up: go to Step 5.
- If the person does not wake up:
 - **CONTINUE TO GIVE** doses every 2-3 minutes in alternate nostril until the person wakes up.
 - It is safe to keep giving doses.

5 STAY



- **STAY** until ambulance arrives: even if the person wakes up.
- **GIVE** another dose if the person becomes very sleepy again. You may need to give additional doses.

Naloxone Nasal Spray is designed to rapidly reverse the effects of **prescribed opioid medications** or **street drugs**, such as:

Fentanyl, Heroin, Norco, OxyContin, Vicodin, Methadone, Codeine, and Dilaudid.

There are **no adverse reactions** if naloxone is given to someone who has not overdosed.

OPIATE WITHDRAWAL SYMPTOMS

- Body aches, fever, sweating, goose bumps
- Runny nose, sneezing
- Yawning, weakness, shivering or trembling
- Nervousness, restlessness, or irritability
- Diarrhea, nausea, vomiting, or abdominal cramps
- Increased blood pressure and increased heart rate



Scan QR Code to view video on how to use Naloxone Spray

Grounded in Health

Instrucciones Para el Uso de Aerosol Nasal Naloxona en Respuesta a Una Sobredosis de Opioides

1 VERIFIQUE SI SOSPECHA UNA SOBREDOSIS

1. COMPRUEBE



VERIFIQUE las señales de una sobredosis de opioides:

- No despierta o responde a su voz o al tocar o esta con mucho sueño.
- La respiración esta lenta o irregular (roncando, gorgoteo o respiraciones jadeantes).
- No hay respiración.
- Pulso débil.
- La piel esta pálida o húmeda, las puntas de los dedos/labios están de un color azul o grisácea.
- La parte central del ojo está muy pequeño, a veces se le llama “pupilas puntiformes.”

2 ADMINISTRE EL AEROSOL NASAL NALOXONA

2. ADMINISTRE el medicamento




- ACUESTE a la persona sobre su espalda.
- SOSTENGA el aerosol nasal naloxona con su dedo pulgar debajo del embolo y su primer y medio dedo en cada lado de la boquilla.
- INCLINE la cabeza de la persona hacia atrás e inserte la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.
- PRESIONE el embolo con firmeza para dar la primera dosis del aerosol nasal naloxona.
- PONGA a la persona de lado.

3 LLAME PARA PEDIR AYUDA MÉDICA DE EMERGENCIA



- Después de dar la primera dosis, LLAME DE INMEDIATO AL 911.
- Aun las personas que respondan al naloxona deberían ser evaluadas y tratadas por un profesional médico entrenado.

4 VEA Y DE



- ESPERE 2 a 3 minutos después de la primera dosis para darle tiempo al medicamento que funcione.
- Si la persona se despierta: siga al paso 5.
- Si la persona no se despierta:
 - Continúe dándole una dosis cada 2 a 3 minutos alternando en cada fosa nasal hasta que la persona se despierte.
 - Es seguro seguir dando las dosis.

5 QUÉDESE



- Quédele hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta.
- De otra dosis si la persona le da sueños devuelta. Tal vez tendrá que dar dosis adicionales.

El aerosol nasal de naloxona es diseñado para rápidamente revertir los efectos de **medicamentos de opioides recetados** y de **drogas de la calle**, como:

Fentanilo, Heroína, Hidrocodona (Norco), Oxycodona (Oxicontin), Vicodin, Metadona, Codeína y Dilaudid.

No hay reacciones adversas si se le da naloxona a alguien que no ha tenido una sobredosis.

SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA DE OPIOIDES

- Dolor de cuerpo, fiebre, sudor, piel de gallina
- Moqueo, estornudos
- Bostezo, debilidad, escalofríos o temblores
- Nerviosismo, inquietud, o irritabilidad
- Diarrea, náuseas, vómitos, o calambres abdominales retortijones
- Aumento de la presión arterial y aumento del ritmo cardiaco



Escanee el código QR para ver el video de cómo usar el aerosol nasal naloxona